

# Quelles sont les connaissances des jeunes parents à la sortie de la maternité avec leur nouveau-né ?

## Introduction

Tendance à la réduction durée moyenne séjour  
Information plus dense : nursing, suivi, signes alertes, prévention  
Recos HAS 2004  
Anxiété parentale

Qu'ont-ils retenu?

## Méthodes

Maternité de Rodez  
MG et PMI 30 km autour maternité  
Questionnaire-quizz remis par medecin lors consultation

Revue littérature narrative pour questionnaire

## Résultats

Janvier-juillet 2016.  
103 questionnaires. 39 médecins.  
Mamans à 91%. 30,8 ans en moyenne.

Source info : Sage-femme à maternité  
Premier vaccin 80% savent. Suivi médical connu à 93%. Définition du taux fièvre 59%.  
Prise en charge fièvre 21% (donner antipyrétique versus urgences ou consultation).  
Résultats mauvais pour : Fièvre, pleurs nourrisson, diarrhée, gêne respiratoire et contenu carnet santé.

## Discussion

- Bonne adéquation :

Vaccination, suivi médical et grands principes prévention (tabagisme, couchage, mort subite du nourrisson)

- Mauvais adéquation :

Signes alertes et pathologies aiguës

- Limites : évaluation globale versus par item

Population - 2 mois.

Représentatif de population générale mais taille échantillon ne permet pas généraliser.

Exclusion pédiatres hospitaliers de Rodez pour ne pas qu'ils modifient info en maternité.

- Biais : en PMI, sages femmes et IDE qui ont plus de temps pour info.

Limites éducative du séjour en maternité : Multiplicité des intervenants.

## Conclusion

Fractionner l'information

Mieux former

Mais il n'existe pas récapitulatif consensuel des informations...

C'est l'objet d'un autre travail en cours.

## Questions

Nursing et alimentation ont été exclues. Idem pour bain et risque pendant sommeil.

Axé sur danger immédiat pas sur expositions chroniques (perturbateurs endocriniens...).